

1. Denominación genérica y distintiva

Denominación comercial: IMBALZA

Denominación genérica: Clorhidrato de Olopatadina

2. Forma farmacéutica

Solución oftálmica (gotas para los ojos)

3. Concentración

0.1%: 1.0 mg de olopatadina por mL

4. Consideración de uso (si aplica)

Sección: XIII. Vía de Administración y Dosis

Uso oftálmico. No es inyectable ni ingerible.

5. ¿Qué es y para qué se utiliza?

Imbalza está indicado para prevenir y tratar la picazón ocular causada por conjuntivitis alérgica, así como otros síntomas oculares relacionados con alergias.

6. ¿Qué necesita saber antes de usar?

No lo use si es alérgico a la olopatadina o a cualquier componente de la fórmula. No se recomienda en niños menores de 3 años. Espere al menos 10 minutos después de aplicarlo antes de colocarse lentes de contacto. En embarazo y lactancia, solo usar si el médico lo considera necesario. Puede causar: ardor, pinchazos, sequedad ocular, sensación de cuerpo extraño, ojos rojos, inflamación de párpados, picazón, cefalea, rinitis, sinusitis, alteración del gusto.

7. ¿Cómo debo usar este medicamento?

Vía de administración: Oftálmica

Dosis recomendada:

IMBALZA 0.1%: 1 o 2 gotas en el ojo afectado, dos veces al día (cada 6 a 8 horas)

IMBALZA 0.2%: 1 o 2 gotas en el ojo afectado, una vez al día

Instrucciones:

- Lávese las manos antes de aplicar
- No toque el ojo con el gotero
- Cierre bien el frasco después de usarlo

8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?

Si tiene hipersensibilidad (alergia) a la olopatadina o a cualquier componente
En niños menores de 3 años

9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?

No se han realizado estudios específicos de interacción con otros medicamentos.

10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?

Consulte a su médico

11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?

Consulte a su médico

12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

Oculares: ardor, pinchazos, sequedad, cuerpo extraño, ojos rojos, queratitis, edema de párpados, picazón.

No oculares: cefalea, astenia, rinitis, sinusitis, alteración del gusto, náuseas, vómito, hipertensión

Reporte de reacciones adversas:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

farmacovigilancia@lgrin.com

13. ¿Cómo se o cuándo debo suspender la toma del medicamento?

Suspenda su uso si presenta síntomas graves o persistentes. Consulte a su médico si los síntomas no mejoran.

14. ¿Qué debo hacer si tomé más de la cantidad indicada?

En caso de sobredosis, lave el ojo con agua tibia. Si persisten molestias, acuda al médico.

15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?

Conservar a no más de 25 °C. Mantener el frasco bien cerrado. No se indica tiempo específico tras apertura, pero seguir indicaciones médicas.



16. Información adicional

Fabricante: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.
Domicilio: Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México

Leyendas de protección:

Su venta requiere receta médica.

No se deje al alcance de los niños.

No se use en niños menores de 3 años.

El empleo durante el embarazo queda bajo responsabilidad del médico.

17. Número de registro del medicamento ante la Secretaría

Número de registro: 036M2018 SSA IV

Clasificación: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Advertencia: Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento