

1. Denominación genérica y distintiva.

Denominación Distintiva: ZONAKER

Denominación Genérica: Hialuronato de Sodio

2. Forma farmacéutica

Solución oftálmica (Gotas para los ojos)

3. Concentración

Cada mililitro (mL) contiene:

Hialuronato de Sodio: 4.0 mg

Vehículo cbp: 1.0 mL

4. Consideración de uso (si aplica).

Uso oftálmico. Se aplica directamente en los ojos.

5. ¿Qué es y para qué se utiliza?

ZONAKER es una lágrima artificial que ayuda a aliviar los síntomas del ojo seco, como ardor, irritación o sensación de arenilla. Lubrica y protege el ojo, mejorando la comodidad visual.

6. ¿Qué necesita saber antes de usar?

No lo use si es alérgico a alguno de sus componentes.

En embarazo o lactancia, debe usarse solo bajo supervisión médica.

Puede causar de forma ocasional:

- Sensación de cuerpo extraño
- Irritación leve
- Visión borrosa temporal (desaparece en 1 minuto)

7. ¿Cómo debo usar este medicamento?

Vía de administración: Oftálmica (en los ojos)

Dosis recomendada: Aplicar 2 gotas en cada ojo cada 30 minutos, hasta 3 o 4 veces al día.

Instrucciones:

- Lávese las manos antes de aplicar.
- No toque el ojo con el gotero.
- Cierre bien el frasco después de usarlo.



8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?

No lo use si tiene hipersensibilidad (alergia) a alguno de los ingredientes.

9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?

No se han reportado interacciones, pero evite usarlo junto con otras soluciones desinfectantes o limpiadoras para los ojos.

10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?

Consulte a su médico

11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?

Consulte a su médico

12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

- Sensación de cuerpo extraño
- Irritación leve
- Visión borrosa temporal

Reporte de reacciones adversas:

- farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
- farmacovigilancia@lgrin.com

Si presenta una reacción alérgica grave, acuda de inmediato al médico.

13. ¿Cómo se o cuando debo suspender la toma del medicamento?

Suspenda su uso si presenta alergia o molestias persistentes.

14. ¿Qué debo hacer si tome más de la cantidad indicada?

No se han reportado casos de sobredosis.

15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?

Consérvese a no más de 30 °C en lugar seco, y con el frasco bien cerrado

Tiempo de uso: No utilizar después de 15 días de abierto el frasco

16. Información adicional (nombre y domicilio del titular del registro sanitario/número de registro sanitario, advertencias, leyendas de protección, etc.)

Fabricante: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Domicilio: Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México

Leyendas de protección:

"Su venta requiere receta médica."

"No se deje al alcance de los niños."

"No utilizar luego de 15 días de abierto el frasco."



17. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA:

422M2004 SSA IV

Clasificación conforme al artículo 226 de la LGS: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento