

1. Denominación Genérica y Distintiva

Denominación Genérica: Brimonidina

Denominación distintiva: Nor Tenz

2. . Forma farmacéutica

Solución oftálmica

3. Concentración

Cada mL contiene 2.00 mg de Brimonidina tartrato

Vehículo cbp 1 ml

4. Consideración de uso (si aplica)

Uso oftálmico. Se aplica directamente en los ojos

5. ¿Qué es Nor Tenz y para qué se utiliza?

Nor Tenz se usa para tratar el glaucoma de ángulo abierto y la presión alta en los ojos (hipertensión ocular). Puede usarse solo o junto con otros medicamentos, y también antes o después de procedimientos con láser.

6. ¿Qué debe saber antes de usar Nor Tenz?

No debe usarse si eres alérgico a la brimonidina o si estás tomando medicamentos como antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO).

7. ¿Cómo debo usar este medicamento?

Consulte a su médico

8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?

No lo uses si tienes alergia a la brimonidina o si estás en tratamiento con IMAO o antidepresivos tricíclicos.

9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?

Sí. Puede interactuar con medicamentos que deprimen el sistema nervioso central como alcohol, barbitúricos, opiáceos, sedantes y analgésicos. También con antihipertensivos, cardiotónicos y betabloqueadores.

10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?

Consulte a su médico.

11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?

Consulte a su médico

12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

Los más comunes son:

- Resequedad en la boca
- Enrojecimiento ocular
- Ardor, picazón
- Dolor de cabeza
- Visión borrosa
- Sensación de cuerpo extraño
- Somnolencia
- También pueden presentarse reacciones alérgicas oculares.

13. ¿Cómo se o cuándo debo suspender la toma del medicamento?

Debes suspenderlo si presentas reacciones alérgicas graves, efectos adversos intensos o si tu médico lo indica.

14. ¿Qué debo hacer si tomé más de la cantidad indicada?

No hay casos reportados por uso tópico. Si se ingiere accidentalmente, se recomienda:

- Inducir el vómito
- Lavado gástrico
- Administrar carbón activado
- Consulte a su médico tratante

15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?

Consérvalo bien cerrado y a no más de 30 °C.

16. Información adicional

Fabricante: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Domicilio: Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Leyendas de protección:

- Literatura exclusiva para pacientes bajo tratamiento
- No se deje al alcance de los niños
- En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico
- Su venta requiere receta médica
- Reporte sospechas de reacción adversa a:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia@lgrin.com

17. Número de registro del medicamento ante la secretaría

Número de registro: 402M2004 SSA IV

Clasificación: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Advertencia: Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento