

## **1. Denominación Genérica y Distintiva**

Denominación Genérica: Hialuronato de Sodio y Clorhidrato de Oximetazolina

Denominación distintiva: GRIMAL

## **2. . Forma farmacéutica**

Solución oftálmica

## **3. Concentración**

- Hialuronato de Sodio: 2 mg
- Clorhidrato de Oximetazolina: 0.25 mg
- Vehículo cbp 1 ml

## **4. Consideración de uso (si aplica)**

- Uso oftálmico. Se aplica directamente en los ojos
- No usar en niños menores de 6 años sin supervisión médica.
- No utilizar después de 15 días de abierto el frasco.

## **5. ¿Qué es Grimal y para qué se utiliza?**

Es un medicamento en gotas que ayuda a aliviar la irritación y el enrojecimiento de los ojos causados por polvo, viento, frío, alergias, contaminación o uso de lentes de contacto. También funciona como lubricante ocular.

## **6. ¿Qué debe saber antes de usar Grimal?**

- Si eres alérgico a alguno de sus componentes, no lo uses.
- Si tienes glaucoma, solo úsalo bajo supervisión médica.

## **7. ¿Cómo debo usar este medicamento?**

Consulte a su médico tratante

## **8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?**

No usar si eres alérgico a sus componentes, o si tienes glaucoma sin indicación médica.

## **9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?**

Sí, consulta a tu médico si tomas antidepresivos tricíclicos o maprotilina, ya que puede haber interacción.

## **10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?**

Consulte a su médico.

## **11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?**

Consulte a su médico

**12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?**

Uso prolongado o excesivo puede causar más irritación y enrojecimiento.

**13. ¿Cómo se o cuándo debo suspender la toma del medicamento?**

Si tienes dolor, cambios en la visión o empeoran los síntomas después de 72 horas, suspende y consulta a tu médico.

**14. ¿Qué debo hacer si tomé más de la cantidad indicada?**

Puede aumentar la irritación y el enrojecimiento. Lava el ojo con abundante solución salina y consulta a tu médico.

**15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?**

- Guárdalo bien cerrado, a no más de 30°C.
- No usar después de 15 días de abierto

**16. Información adicional**

Titular del registro sanitario: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Leyendas de protección:

- Literatura exclusiva para pacientes bajo tratamiento
- No se deje al alcance de los niños
- En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico
- Su venta requiere receta médica
- Reporte sospechas de reacción adversa a:  
[farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)  
[farmacovigilancia@lgrin.com](mailto:farmacovigilancia@lgrin.com)

**17. Número de registro del medicamento ante la secretaría**

Número de registro sanitario: 509M2004 SSA IV

Clasificación: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Advertencia: Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento