

1. Denominación Genérica y Distintiva

Denominación Genérica: Diclofenaco

Denominación distintiva: LODYFEN®

2. . Forma farmacéutica

Solución oftálmica

3. Concentración

Cada mL contiene:

- Diclofenaco Sódico: 1 mg
- Vehículo cbp: 1 MI

4. Consideración de uso (si aplica)

Uso oftálmico. Se aplica directamente en los ojos

5. ¿Qué es LODYFEN y para qué se utiliza?

LODYFEN® sirve para tratar inflamaciones del ojo como conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales y lesiones de la córnea o conjuntiva cuando no hay infección asociada. También ayuda a reducir la inflamación después de cirugía de cataratas y a evitar la contracción del iris durante procedimientos quirúrgicos

6. ¿Qué debe saber antes de usar LODYFEN?

No debe usarse si la persona es alérgica al diclofenaco, a otros antiinflamatorios o a la aspirina. Tampoco debe usarse en personas con problemas de sangrado como hemofilia.

7. ¿Cómo debo usar este medicamento?

Consulte a su médico

8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?

No debe utilizarse si hay alergia a los antiinflamatorios no esteroides, aspirina o cualquiera de los componentes del producto, así como en pacientes con problemas de coagulación.

9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?

Sí. LODYFEN® puede disminuir el efecto de medicamentos como carbacol y también interferir con fármacos que alteran la coagulación (por ejemplo, anticoagulantes como heparina o derivados de cumarina).

10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?

Consulte a su médico.

11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?

Consulte a su médico

12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

Puede causar ardor, comezón o incomodidad en el ojo. En algunos casos se han reportado queratitis, edema, aumento de la presión intraocular o reacciones inflamatorias, aunque no siempre están directamente relacionadas con el medicamento.

13. ¿Cómo se o cuándo debo suspender la toma del medicamento?

Debe suspenderse si se presenta irritación intensa, alergia o cualquier reacción inesperada en el ojo.

14. ¿Qué debo hacer si tomé más de la cantidad indicada?

Consulte a su médico

15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?

Debe mantenerse a no más de 30°C y con el frasco bien cerrado.

16. Información adicional

Fabricante: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Domicilio: Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Leyendas de protección:

- Literatura exclusiva para pacientes bajo tratamiento
- No se deje al alcance de los niños
- En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico
- Su venta requiere receta médica
- Reporte sospechas de reacción adversa a:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia@lgrin.com

17. Número de registro del medicamento ante la secretaría

Número de registro: 290M99 SSA IV.

Clasificación: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Advertencia: Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento