

1. Denominación Genérica y Distintiva

Denominación Genérica: Tripsina y Quimotripsina

Denominación distintiva: RIBOTRIPSIN®

2. . Forma farmacéutica

Tabletas con capa entérica

3. Concentración

- Cada tableta contiene 45,000 U USP de Tripsina y 9,000 U USP de Quimotripsina
- Excipiente: cbp 1 tableta

4. Consideración de uso (si aplica)

RIBOTRIPSIN® es de uso oral y no debe tomarse junto con alimentos ni con bebidas alcohólicas. Se recomienda precaución en personas que toman anticoagulantes o que tienen problemas estomacales, como úlceras.

5. ¿Qué es RIBOTRIPSIN y para qué se utiliza?

RIBOTRIPSIN® sirve para disminuir la inflamación, el edema, los moretones y el dolor que resultan de golpes o lesiones leves en piel y tejidos blandos. También acelera la reabsorción de exudados y ayuda a que la recuperación del área lastimada sea más rápida.

6. ¿Qué debe saber antes de usar RIBOTRIPSIN?

Este medicamento se toma por vía oral. Evita el alcohol mientras lo uses. Si estás con tratamiento anticoagulante, avisa a tu médico porque puede requerirse vigilancia adicional del sangrado. Si tienes molestias gástricas o antecedentes de úlcera, úsalo con precaución y reporta cualquier síntoma digestivo inusual. En embarazo y lactancia, no se recomienda durante el primer trimestre y, en general, su uso debe decidirlo el médico valorando riesgos y beneficios

7. ¿Cómo debo usar este medicamento?

Consulte a su médico tratante

8. ¿Cuándo no debo usar este medicamento?

No debe usarse en personas con alergia a las enzimas, enfermedad hepática grave, problemas de sangrado, insuficiencia cardíaca severa, pancreatitis o si están a punto de someterse a cirugía.

9. Si estoy tomando otro(s) medicamento(s), ¿puede haber algún problema?

Sí. No debe tomarse junto con anticoagulantes, ya que potencia su efecto y puede aumentar el riesgo de sangrado

10. ¿Debo tener cuidados o dieta especial a seguir mientras tomo este medicamento?

Consulte a su médico.

11. ¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis de este medicamento?

Consulte a su médico

12. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos?

RIBOTRIPSIN® suele ser bien tolerado. En casos raros pueden aparecer molestias digestivas leves, urticaria, comezón o erupciones leves en la piel. En situaciones excepcionales puede aparecer hematuria (sangre en orina). Estos efectos suelen desaparecer al suspender el medicamento.

13. ¿Cómo se o cuándo debo suspender la toma del medicamento?

Debe suspenderse si se presentan reacciones alérgicas, molestias digestivas intensas, sangrado o síntomas que empeoren. Si el paciente toma anticoagulantes, cualquier signo de sangrado requiere suspensión inmediata y atención médica.

14. ¿Qué debo hacer si tomé más de la cantidad indicada?

Una sobredosis puede aumentar los efectos adversos. En ese caso, se recomienda suspender la toma y consultar a su médico.

15. ¿Cómo y por cuánto tiempo puedo guardar este medicamento una vez abierto?

Debe conservarse a temperatura ambiente, no mayor de 30°C.

16. Información adicional

Titular del registro sanitario: Laboratorios Grin, S.A. de C.V.

Rodríguez Saro No. 630, Col. Del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Leyendas de protección:

- Literatura exclusiva para pacientes bajo tratamiento
- No se administre con alimentos
- No se deje al alcance de los niños
- En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico
- Su venta requiere receta médica
- Reporte sospechas de reacción adversa a:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
farmacovigilancia@lgrin.com



17. Número de registro del medicamento ante la secretaría

Número de registro sanitario: 65517 SSA

Clasificación: Grupo IV (medicamento de venta con receta médica)

Advertencia: Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Material de uso exclusivo para pacientes bajo tratamiento